


FELIMAZOLE®

Felimazole® Vet.

Ditt val vid hypertyreos

NYHET
**Honungs-
smak**
 1,25 mg
  2,5 mg
  5 mg

Flexibel lösning för alla dina patienters och kattägars behov

Felimazole vet. 1,25 mg, 2,5 mg och 5 mg, dragerad tablett och 5 mg/ml oral lösning för katt. **Aktiv substans:** Tiamazol. **Rx. ATC-kod:** QH03BB02. **Djurslag:** Katt. **Indikationer:** För stabilisering av hypertyreoidism hos katt inför kirurgisk tyreoidektomi. För långtidsbehandling av hypertyreoidism hos katt. **Kontraindikationer:** Skall inte användas till katter som lider av systemisk sjukdom, som primär leversjukdom eller diabetes mellitus. Skall inte användas till katter som visar kliniska tecken på autoimmun sjukdom. Skall inte användas till djur som lider av störningar i vita blodbild, som neutropeni och lymfopeni. Skall inte användas till djur som lider av trombocytrubningar och koagulationsrubningar (i synnerhet trombocytopeni). Skall inte användas till katter som är allergiska mot tiamazol eller hjälpämnet polyetylen glykol. Skall inte användas till dräktiga eller lakterande katter. **Särskilda försiktighetsåtgärder:** Om mer än 10 mg per dag skall användas, bör djuren övervakas speciellt noggrant. Användning av detta läkemedel till katter med njurfunktionsstörning ska föregås av en noggrann risk-nytta-bedomning av veterinären. Då tiamazol kan en reducerande effekt på den glomerulära filtrationshastigheten ska behandlingens effekt på njurfunktionen noga övervakas, eftersom försämring av ett bakomliggande tillstånd kan inträffa. Hematologin måste övervakas på grund av risk för leukopeni eller hemolytisk anemi. Om djuret plötsligt förefaller må dåligt under behandlingen, i synnerhet om det har feber, ska blodprov tas för rutinmässig hematologi och biokemi. Neutropena djur (neutrofilvärde <2,5x10⁹/l) skall behandlas profylaktiskt med bakteriedödande antibakteriella läkemedel och stödjande terapi. Eftersom tiamazol kan förorsaka hemokonzentration skall katter alltid ha tillgång till dricksvatten. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet:** Tvätta händerna efter användande. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipsacksdelen eller etiketten. Tiamazol kan förorsaka kräkningar, epigastriskt obehag, huvudvärk, feber, artralgi, klåda och pancytopeni. Behandlingen är symtomatisk. Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av kräkningar eller använt kattströ från behandlade djur. **At, drick och rök inte vid hantering av läkemedlet, kräkning eller använt kattströ från behandlade djur.** Detta läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner efter hudkontakt. Hantera inte detta läkemedel om du är allergisk mot tiamazol eller något av hjälpämnena. Om allergiska symptom utvecklas, såsom hudutslag, svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningsvärgårigheter, ska du genast uppsöka läkare och visa bipsacksdelen eller etiketten. Tabletten får inte delas eller krossas. Lämna inte fyllda sprutor obevakade. Sätt omedelbart tillbaka locket när sprutan har fyllts. Eftersom tiamazol är en misstänkt human teratogen och utsöndras i bröstmjölk, måste fertila och ammande kvinnor bära icke-genomträngliga handskar när de hanterar läkemedlet, kräkningar eller använt kattströ från behandlade djur. Om du är gravid, misstänker att du är gravid eller försöker bli gravid, ska du inte administrera läkemedlet eller hantera behandlade katters använda kattströ/kräkningar. Efter administrering av läkemedlet ska eventuella läkemedelsrester på spetsen av doseringssprutan torkas av med en servett. Den kontaminerade servetten ska genast kasseras, den använda sprutan ska förvaras tillsammans med läkemedlet i originalförpackningen. **Biverkningar:** Biverkningar har rapporterats efter långvarig kontroll av hypertyreoidism. I många fall kan symptomen vara milda och övergående och ej utgöra någon anledning att avbryta behandlingen. De mer allvarliga biverkningarna är vanligen reversibla när medicineringen avbryts. Negativa reaktioner är ovanliga. De vanligaste kliniska biverkningarna som har rapporterats inkluderar kräkningar, dålig aptit/anorexi, håglöshet, svår prurit och sår på skallen och nacken, ökad blödningsbenägenhet och gulsot i samband med hepatopati, och hematologiska avvikelser (eosinofili, lymfocytos, neutropeni, lymfopeni, lätt leukopeni, agranulocytos, trombocytopeni eller hemolytisk anemi). Dessa biverkningar försvinner mellan 7 och 45 dagar efter att tiamazolterapi har avbrutits. Möjliga immunologiska biverkningar inkluderar anemi, med sällsynta biverkningar inklusive trombocytopeni och serum anti-nukleära antikroppar. Lymfadenopati kan förekomma, men det är mycket sällsynt. Behandlingen ska avbrytas omedelbart och alternativa terapier beaktas efter en lämplig återhämtningsperiod. Efter långvarig behandling av rätter med tiamazol har det förekommit en ökad risk för neoplas i sköldkörteln, men inga bevis är tillgängliga för katter. **Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:** Samtidig behandling med fenobarbital kan eventuellt reducera effekten av tiamazol. Det är känt att samtidig behandling med tiamazol reducerar den hepatiska oxidationen av maskmedel tillhörande bensimidazolgruppen, vilket kan leda till ökade plasmakonzentrationer av bensimidazol. Tiamazol är immunmodulatoriskt, vilket skall beaktas vid övervägande av vaccination. **Dosering och administrationssätt:** Oral användning. Rekommenderad startdos är 5 mg/dygn för stabilisering av hypertyreoidism hos katt före kirurgisk tyreoidektomi, samt för långtidsbehandling av hypertyreoidism hos katt. Om möjligt bör den totala dagliga dosen delas upp i två dosstillfällen och administreras morgon och kväll. Tabletten bör inte delas. Om doseringen 5 mg en gång dagligen är att föredra pga bättre följsamhet är detta acceptabelt, även om 2,5 mg två gånger dagligen kan vara mer effektiv på kort sikt. Tabletten om 5 mg är också lämplig för katter som kräver högre dosering. Använd sprutan som medföljer i förpackningen för att administrera den exakta dosen. Sprutan passerar på flaskan och är graderad i steg om 0,25 mg upp till 5 mg. Dra upp den erforderliga dosen och ge läkemedlet direkt in i kattens mun. Hematologi, biokemi och totalt serum T4 bör utvärderas innan behandling påbörjas, och efter 3 veckor, 6 veckor, 10 veckor, 20 veckor, och därefter var 6:e månad. Vid var och en av de rekommenderade övervakningsintervallen bör ny dosering ske som baseras på totalt T4 och klinisk respons på behandlingen. Justering av dosen bör göras i steg om 2,5 mg och målet bör vara att uppnå lägsta möjliga dosering. Om mer än 10 mg per dag behövs, bör du övervakas särskilt noga. Den administrerade dosen får inte överstiga 20 mg/dag. För långtidsbehandling av hypertyreoidism bör djuret behandlas hela livet. **Förpackningsinformation:** Blistersförpackning 100 tabletter. Varje blister innehåller 25 tabletter. Oral lösning: Flaska och medföljande spruta förvaras i en kartong. **Innehavare av godkännande för försäljning:** Dechra Regulatory B.V. **Lokalt ombud:** Dechra Veterinary Products AB. **Senast översyn av SPC:** Tablett: 2021-09-30. Oral lösning: 2024-10-31. **Texten ovan är ett förkortat sammandrag av produktresumén. För ytterligare information, vänligen se www.fass.se eller www.dechra.se.**

Dechra Veterinary Products AB
technical.nordic@dechra.com
©Dechra Veterinary Products A/S

www.dechra.se
08-32 53 55
Januari 2025


Dechra
ARBETSMILJÖENKÄTEN:

Färre veterinärer utsatta för hot och våld

Arbetsmiljön för Sveriges veterinärer har länge varit ett hett diskussionsämne. I Sveriges Veterinärförbunds senaste medlemsundersökning framträder både utmaningar och framsteg. Den viktigaste insikten är att antalet veterinärer som upplever hot och våld på arbetsplatsen har minskat. Detta resultat är ett tydligt kvitto på flera års målmedvetet arbete från Sveriges Veterinärförbund, som genom intervjuer, skrivelser och i samarbete med arbetsgivare har lyft fram veterinärernas utsatta arbetssituation. Samtidigt visar undersökningen att det fortfarande finns stora utmaningar, inte minst när det gäller arbetsbelastning och administrativa krav.

→ **Text** Mats Janson

UNDER VETERINÄRMÖTET i Västerås, den 21 november 2024, presenterade Björn Santesson, ombudsman på Sveriges Veterinärförbund, de första resultaten från den senaste arbetsmiljöenkäten. Enkäten som gick ut till förbundets samtliga medlemmar hade en svarsfrekvens på 47,2 procent och visar att svarsfördelningen speglar medlemskåren väl, både vad gäller kön och arbetssektor. Noterbart är att medlemmar inom kommunal sektor hade den högsta svarsfrekvensen, med 100 procent – även om de representerar en mindre del av yrkesgruppen.

Resultaten visar ökad administrativ börda

En av de tydligaste trenderna i undersökningen är en ökning av administrativa arbetsuppgifter.

– Vi ser en markant förskjutning jämfört med förra året, förklarade Björn Santesson. Det administrativa arbetet har ökat inom samtliga sektorer, oavsett om man arbetar 20 eller fler timmar i veckan.

Samtidigt visar undersökningen att färre medlemmar helt och hållet upplever

sin arbetsmiljö som god. Svaret "Instämmer helt" har minskat, medan "instämmer delvis" som svar har ökat. Detta tyder på att arbetsmiljön generellt upplevs som sämre jämfört med tidigare år. Analysen av resultaten pågår fortfarande, men redan nu är det tydligt att medlemmarnas arbetsmiljö har blivit en större utmaning.

Fortsatta utmaningar med arbetsbelastning och etisk stress

Marknaden har genomgått omfattande neddragningar, men veterinärerna har ofta skonats från direkta uppsägningar. Däremot påverkas deras arbetssituation indirekt, eftersom andra funktioner inom verksamheterna drabbas hårt. Det innebär att veterinärerna får ta på sig fler administrativa och operativa uppgifter, vilket bidrar till en ökad arbetsbelastning.

– Vi ser att cirka 30 procent av våra medlemmar redan arbetar deltid på grund av arbetsbelastningen, och ytterligare 30 procent överväger att gå ner i tid, säger Björn Santesson. Det här är allvarliga siffror som har fått arbetsgivare att reagera.

Samtidigt visar medlemsundersökningen en ökning av etisk stress, framför allt

kopplad till ekonomiska och organisatoriska faktorer samt bristande stöd från arbetsgivare. Etisk stress uppstår när veterinärer ställs inför svåra dilemman som påverkar deras professionella och personliga värderingar.

Minskning av hot och våld

På den positiva sidan har rapporterade fall av hot och våld i arbetsmiljön minskat. Detta tillskrivs flera års målmedvetet arbete från förbundets sida, där hot och våld har lyfts i både interna och externa sammanhang.

– Det är tydligt att när man tar en sådan fråga på allvar och arbetar långsiktigt med den, blir arbetsmiljön tryggare för de anställda, säger Björn Santesson.

Även Magnus Rosenquist, förbundsdirektör på Sveriges Veterinärförbund, ser en koppling mellan förbundets arbete och det förbättrade resultatet:

– Vi har arbetat målmedvetet med att minska hot och våld mot veterinärer på flera fronter, säger han. Bland de viktigaste insatserna är att öka medvetenheten i den offentliga debatten.

Rent praktiskt har SVF lyft frågan

om hot och våld i arbetsmiljön i otaliga intervjuer och debattartiklar. I och med det har även allmänheten kontinuerligt informerat om veterinärers arbetsvillkor. Att sätta fokus på detta har varit avgörande för att skapa förändring.

Samverkan med arbetsgivare har också varit viktigt. Förbundets arbete med arbetsmiljögrupper har bidragit till konkreta förbättringar på arbetsplatserna och genom långsiktigt fackligt arbete har förbundet drivit på för tydliga riktlinjer och krav på arbetsgivarna.

– Vi har samarbetat med arbetsgivarorganisationer som Gröna Arbetsgivare för att skapa tryggare arbetsvillkor. Vårt arbete har också lett till en ökad förståelse för veterinärprofessionens utsatta position, säger Magnus Rosenquist som ser den årliga arbetsmiljöenkäten som ett starkt underlag för att driva på för förändring.

– Även om vi, genom vårt arbete, har kunnat se en tydlig minskning av hot och våld i arbetsmiljön, är vi långt ifrån färdiga. Det här är en fråga vi fortsätter att prioritera, säger Björn Santesson.

Krängliga IT-system skapar stress

En annan tydlig utmaning som framkom i undersökningen handlar om hanteringen av digitala system. Cirka 25 procent av veterinärerna upplever stora problem med IT-systemen i sitt arbete. Detta bekräftas av medlemmar som Sveriges Veterinärförbund har mött under arbetsplatsbesök.

– Förr kunde en halvtimme räcka för ett patientbesök och efterarbetet. Nu räcker inte tiden längre eftersom systemen är så krångliga och det är många parametrar att ställa in, förklarar Björn Santesson.

Utöver att systemen är tidskrävande och svårhanterliga visar undersökningen att 55 procent av medlemmarna inte blir tillfrågade innan nya IT-system införs. Beslut fattas ofta utan att ta hänsyn till användarnas behov eller arbetsmiljö.

– Arbetsgivarna verkar inte förstå varför det är viktigt att fråga veterinärerna om vilka system de ska använda, säger Björn Santesson.

Den bristande användarvänligheten och bristen på dialog skapar onödigt stress i arbetsvardagen. Sveriges Veterinärförbund har lyft frågan direkt med arbetsgivarna och påpekat vikten av att inkludera användarnas perspektiv när nya system implementeras.

Arbetsbelastning finansierar dålig arbetsmiljö

Medlemsundersökningen bekräftar att många av de utmaningar som identifie-

rades i förra årets enkät kvarstår, medan vissa områden har förvärrats. Bland de mest oroande resultaten är att hälften av medlemmarna överväger att byta arbetsplats eller lämna yrket helt. En fjärdedel av veterinärerna uppger att de aktivt funderar på att lämna professionen, och en tredjedel överväger att gå ner i arbetstid.

– Det är ett stort problem när arbetsbelastningen tvingar veterinärer att jobba deltid. I praktiken finansierar man arbetsgivarens dåliga arbetsmiljö med sina egna lönepengar, säger Björn Santesson.

Han menar att ett förbättrat arbetsmiljöarbete inte bara skulle möjliggöra heltidsarbete utan också bidra till att täppa igen den brist på veterinärkompetens som finns på flera håll i landet.

Samtidigt har den tidigare debatten om veterinärbrist minskat i intensitet. Från SVF:s håll ser man en koppling till att stora aktörer inom den privata sektorn har gjort neddragningar, vilket har dämpat konkurrensen om veterinärer och de kraftiga löneökningarna som tidigare präglade branschen.

Sveriges Veterinärförbund planerar nu att föra vidare resultaten från undersökningen till arbetsgivarna, både genom direkta möten och i samarbete med förtroendevalda. Målet är att jämföra förbundets undersökning med arbetsgivarnas egna medarbetarundersökningar för att hitta gemensamma slutsatser och lösningar.

– Ingen vill se siffror som visar att 26 procent av veterinärerna vill lämna yrket. Det är vår roll som professionsförbund att visa vad våra medlemmar säger och få

arbetsgivarna att ta detta på allvar, säger Björn Santesson.

Administration och enkäten som verktyg för förändring

Ett återkommande problem i undersökningen är de ökande kraven på administration.

Enligt en kommentar från åhörarna handlar det inte bara om IT-system. Nya föreskrifter om vad som ska dokumenteras i journaler och motiveringar för utskrivna läkemedel, tillsammans med fler krav på differentialdiagnoser, har också ökat arbetsbördan.

Trots de dystra siffrorna ser Sveriges Veterinärförbund möjligheter att använda resultaten som ett verktyg för att påverka arbetsgivarna.

– Det här materialet är viktigt för att skapa en grund för dialog. Arbetsgivarna lyssnar, och när vi jämför våra resultat med deras medarbetarundersökningar kan vi hitta gemensamma nämnare, tillägger Torbjörn Bidebo, även han ombudsman på SVF.

För att ytterligare stärka arbetet planerar Sveriges Veterinärförbund att fortsätta att genomföra arbetsmiljöenkäten årligen.

– Med en högre svarsfrekvens kan vi skapa en ännu tydligare och mer representativ bild. Även om resultaten varierar mellan statliga och privata arbetsgivare, och ibland även mellan enskilda bolag, ger en årlig enkät oss en ovärderlig jämförelsepunkt, säger Björn Santesson.

Han uppmantrar också medlemmar att lämna synpunkter och idéer kring enkäten för att ytterligare förbättra den. ■

FOTO: STOCK.ADOBE.COM



BRAVECTO® injektion



GER ETT ÅRS SKYDD MOT FÄSTINGAR OCH LOPPOR



VI INTRODUCERAR DEN FÖRSTA INJEKTIONEN

som möjliggör exklusivt för veterinärer att ge hundar ett år av oavbrutet skydd mot fästingar och loppor.

Upptäck effekten av **BRAVECTO®** injektion och dess innovativa formulering.



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
All rights reserved. SE-BRV-250100002
www.msd-animal-health.se



Kontakta din lokala
representant från
MSD Animal Health

BRAVECTO® (fluralaner), 150 mg/ml pulver och vätska för injektionsvätska, suspension för hund. Med omedelbar och varaktig avdödande effekt på loppor (*Ctenocephalides felis* och *Ctenocephalides canis*) under 12 månader. Nya loppor dödas inom 24 timmar, från en vecka till 12 månader efter behandling. Med varaktig avdödande effekt på fästingar från 3 dagar till 12 månader för *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus* och *Dermacentor reticulatus* samt varaktig avdödande effekt på fästingar från 4 dagar till 12 månader för *Rhipicephalus sanguineus*. Nya fästingar dödas inom 48 timmar, från en vecka till 12 månader efter behandling. Minskar risken för infektion med *Babesia canis canis*, via överföring av *D. reticulatus*, samt minskar risken för infektion med *Dipylidium caninum*, via överföring av *C. felis*, i upp till 12 månader. Effekten är indirekt genom läkemedlets aktivitet mot dessa vektorer. Parasiten måste sätta sig fast på/bita värdjuret för att exponeras för fluralaner, därför kan risk för parasitöverförda sjukdomar inte helt uteslutas. Behandling sker med 0,1 ml färdigberedd suspension per kg kroppsvikt (motsvarande 15 mg fluralaner per kg kroppsvikt) subkutant. Kan användas till valpar från 6 månaders ålder. Säkerheten för detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation eller hos hundar med befintlig epilepsi. Vanliga biverkningar är svullnad vid injektionsstället. Mindre vanliga biverkningar är nedsatt aptit, trötthet och hyperemiska slemhinnor. Mycket sällsynta biverkningar är muskeltremor, ataxi och konvulsioner. Receptbelagt läkemedel. Senast godkända produktresumé: 2024-01-08. För mer info: www.fass.se.